

<i>Erkrankung</i>	<i>Inkubationszeit</i>	<i>Wiederezulassung der erkrankten Person</i>	<i>Spezielle Maßnahmen</i>
3-Tage-Fieber	7-14 Tage	24h fieberfrei	
Ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	Wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden ist, nur bei Adenoviren, Attest erforderlich	Hände, Wäsche, Spielzeug, Flächen
Borkenflechte (Impetigo contagiosa)	2-10 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Abheilen, Attest erforderlich	Hände, Wäsche
EHEC	2-10 Tage	Nach Genesung und 3 negativen Stuhlproben, Attest erforderlich	Hände, Wäsche, Geschirr, Spielzeug, Flächen
Erkältungskrankheiten			
• Ohne Fieber		Kein Ausschlussgrund	Hände
• mit Fieber (>38 Grad Celsius)		24h fieberfrei	
• Grippe (Influenza)	1-2 Tage	Nach Genesung	Impfung Hände, Flächen
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	4-30 Tage	Nach Genesung	Hände, Wäsche, Geschirr, Spielzeug, Flächen
Hepatitis A/E	15-50/64 Tage	Nach ärztlicher Rücksprache	Impfung Hände, Wäsche, Geschirr, Spielzeug, Flächen
Keuchhusten (Pertussis)	7-20 Tage	5 Tage nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach 3 Wochen	Impfung
Kopfläuse		Nach 1. Behandlung	2. Behandlung nach 8 Tagen Wäsche
Krätze (Skabies)	14-42 Tage	Nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache, Attest erforderlich	Nachkontrolle nach 14 Tagen Hände, Wäsche
Magen-Darm-Erkrankungen			
• Norovirus/Rota-virus	1-3 Tage	Frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall	Impfung (Rotaviren) Lebensmittelhygiene beachten Hände, Wäsche, Geschirr, Flächen
• Salmonellen	1-3 Tage		
• Campylobacter	1-10 Tage		
• Unbekannte Erreger			
Masern	8-21 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Impfung
Meningitis			
• Haemophilus influenzae b (Hib)	2-4 Tage	Nach Antibiotikagabe und Genesung	Impfung
• Meningokokken	2-10 Tage		
Mumps	12-25 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüenschwellung	Impfung
Mundfäule	2-12 Tage	Nach Genesung	Hände, Geschirr
Pfeiffersches Drüsenfieber	7-30 Tage	Nach Genesung	Hände, Geschirr
Ringelröteln	7-14 Tage	Mit Beginn des Ausschlags	Hände, Flächen
Röteln	14-21 Tage	Nach Genesung und 1 Woche nach Beginn des Ausschlags	Impfung
Scharlach, Streptokokken A-Mandelentzündung	1-3 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Genesung	Hände, Geschirr, Flächen
Tuberkulose	6-8 Wochen	Nach ärztlichem Urteil, Attest erforderlich	Untersuchung durch Gesundheitsamt, Lüften
Windpocken	8-28 Tage	Nach Abheilen der Bläschen	Impfung

Hände = verstärkte Händehygiene

Geschirr = Geschirr in der Spülmaschine >60 Grad

Flächen = Handkontaktflächen desinfizieren (z.B. Türklinke)

Wäsche = Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel

Spielzeug = Spielzeug nach Kontakt desinfizieren und reinigen

Quelle: Gesundheitsamt der Städteregion Aachen